



能登やさしいこめづくり情報 【速報】 早生出穂期予想

生育観測（6/23）の結果から予想される「ゆめみづほ」の出穂期は

7月13日～16日頃（5月上旬植え圃場での値）です。

【分施肥体系】

- ・生育過剰なほ場や葉色が濃いほ場では、1回目の穂肥時期は遅らせず、量のみを減らして施用してください。
- ・1回目が施用出来なかった場合でも、**2回目の穂肥は必ず施用して下さい。**
（稲体の消耗を防ぎ登熟向上を図る）。

品種	出穂予想	回数	実施時期の目安		肥料名 (基準施用量)
			幼穂長・葉耳間長	本年	
ゆめみづほ	7月13日頃	1回目	幼穂長1～3mm 葉色4.0未満	6月23日頃 (20日前) ※直ちに実施	BB追肥550号 (15kg/10a)
		2回目	葉耳間長±0 cm	7月3日頃 (10日前)	BB追肥550号 (20kg/10a)
※追肥を1回目の時期の1回のみで終わらせないこと！！					

【基肥一発肥料体系での追加穂肥】

- ・基肥一発肥料では、基本的には追肥の必要はありませんが、
①登熟期の高温による栄養凋落の防止と②収量の向上のため、
必要に応じて上乗せ追肥を実施しましょう。
※「BB早生一発くんDX28」を施用した場合は、上乗せ追肥は原則不要です。

施用時期	葉色	肥料名	10aあたり施用量
出穂7～10日前 (葉耳間長0～2cm)	5.0未満	BB追肥550号	7～10kg (N:1～1.5kg)

【参考：コシヒカリ生育状況】

現在の生育観測結果から予想される「コシヒカリ」の出穂期は、

7月19日～7月20日（4月末～5月上旬植え圃場での値）で、

1回目の穂肥時期は**7月3日頃**（出穂16日前・幼穂長15mm）となります。

上記については現時点での予想であり、今後の気象条件により前後する可能性が

あるため、次回の中生出穂期速報については**6月30日**に発信する予定です。

